



Prise en soins au domicile
et importance de
l'accompagnement

Mr Dupont Hervé
Infirmier Remedus
Mme Nise Sabine
CSO hématologie

Bortezomid (velcade® au domicile)

- Explication schéma thérapeutique :
4 injections SC : j1, j4, j8, j11)
recycle 3 semaines
8 cures au total

Aperçu général de Homecare Velcade® est instauré chez le patient

inscription	Le médecin administre les injections du 1 ^{er} cycle(et la 1 ^{er} administration des cycles suivants) à l'hôpital	Le médecin inscrit le patient à homecare et transmet au pharmacien hospitalier une prescription pour les administrations à domicile	L'infirmier Remedus contacte le patient (présentation du service + planification des rendez-vous)
1 jour avant l'administration	L'infirmier Remedus appelle le patient et passe en revue une liste de questions médicales	L'infirmier Remedus appelle le pharmacien, hospitalier → confirmation de la préparation du médicament et de l'heure de l'enlèvement	
Jour de l'administration	L'infirmier Remedus enlève les médicaments à la pharmacie de l'hôpital et visite le patient à l'heure convenue	Remedus pose des questions médicales au patient vérifie les paramètres médicaux et réalise des contrôles de sécurité	Administration de Velcade® et enregistrement dans le système IT de Remedus (Remecare)

Rôle de l'infirmière

- Informer le patient des dates de passage de l'infirmier du domicile
- contacter par téléphone Mr Dupont pour le calendrier des injections
- Compléter et envoyer par mail les documents à la société Remedus et à Mr Dupont pour assurer la prise en charge du patient
- Le plus important est la communication et la collaboration entre les intervenants

Pratiquement :

Le pharmacien doit:

- Effectuer la préparation du velcade® sécurisée sous flux laminaire
- Vérifier la validation de la prescription
- Indiquer clairement sur l'emballage ou la seringue, l'heure exacte de la reconstitution du produit et de la dose précise contenue dans la seringue(en mg)
- L'infirmier Remedus enregistre l'heure de reconstitution, l'heure d'administration (endéans les 8 heures) et la dose administrée au patient
- Si l'administration ne peut avoir lieu, il convient de restituer au pharmacien hospitalier la seringue dans son emballage original afin d'assurer une destruction adéquate et sécurisée

Bortezemid® stable pendant 8 heures après reconstitution
(conserver entre 2° et 8 ° à l'abri de la lumière)

Avantages :

- 98% des patients atteints de myélome multiple préfèrent l'administration de velcade® à domicile
- Réduction constante de la durée moyenne de séjour à l'hôpital d'où diminution du coût à la sécurité sociale
prix forfait hôpital de jour : 124 euros
honoraires surveillance hématologue : 16 euros
- ↓ risque d'infections nosocomiales
- Diminution des déplacements et du temps d'attente
- Impact positif sur la qualité de vie
- Soulager l'activité de l'HDJ

Inconvénients

- Moins de contacts avec équipe référente
- Circuit plus complexes
- Sécurisation des actes de soins

La décision de réaliser une chimiothérapie à domicile ne peut être prise sans **une information précise** et sans consentement **clair** du patient et de son entourage.

Compliance au traitement : facteurs influençant

- L'information : sur la maladie **le 1° pas**
 - les risques évolutifs
 - les bénéfices attendus
 - les risques et effets secondaires du traitement
- L'implication de la famille et de l'entourage dans le projet thérapeutique

- Effets indésirables les plus fréquents
 - Neuropathies périphériques
 - Troubles gastro-intestinaux sévères: diarrhées et / ou constipation
 - Toxicité hématologique
 - Zona
 - Réactions locales à l'injection: rougeur, induration
 - Asthénie
 - Hypotension orthostatique légère à modérée

Déroulement de la visite à domicile vérification des paramètres médicaux

- Tension artérielle
- Fréquence cardiaque
- Température
- Symptômes d'herpès
- Symptômes évocateurs d'une diminution de plaquettes
- Contrôles de sécurité conforme (identité patient, conservation respectée, dose et solution dans la seringue)
- Si dépassement d'un seuil d'alerte contact téléphonique avec personne de contact à l'hôpital

Merci de votre attention