



■ Contact :

Rendez-vous consultation chirurgie pédiatrique :

☎ 071/92.21.91 ou ☎ 071/92.25.11

Rendez-vous consultation anesthésie :

☎ 071/92.25.11 (ou ☎ 071/92.33.80)

Hopital de jour pédiatrique : ☎ 071/92.13.71

Urgences : ☎ 071/92.34.33

Digit MC-110- dépliant 2 volets circoncision



LA CIRCONCISION



■ Qu'est-ce que la circoncision ?

La circoncision consiste à enlever de manière chirurgicale le prépuce, la peau qui recouvre l'extrémité du pénis et exposer ainsi le gland.

■ Avant l'intervention

Le service des rendez-vous vous contactera afin de fixer un rendez-vous avec l'équipe d'anesthésie au moins 8 jours avant l'intervention. Si une semaine avant la date d'opération vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez contacter le ☎ 071/92.33.80.

Avant le jour de l'intervention, vous devrez effectuer une admission anticipée en passant par les admissions hospitalisation afin de réaliser les formalités administratives en vue de l'opération.

La veille de l'opération, vous serez contacté par l'hôpital, afin de confirmer l'heure de l'intervention. Nous vous indiquerons à quelle heure arriver ainsi que le moment et à partir de quand votre enfant devra cesser de boire et manger. Il est important qu'il soit à jeun pour l'opération.

■ L'intervention

La circoncision se passe sous anesthésie générale (l'enfant dort complètement) et est associée à une anesthésie locale, afin de soulager la douleur.

Il s'agit généralement d'une hospitalisation de jour (l'enfant rentre à la maison en fin de journée). Toutefois, si l'enfant est porteur d'une maladie, l'anesthésiste peut décider d'hospitaliser l'enfant (une ou plusieurs nuits).

Le jour de l'opération, passez d'abord par les admissions pour inscrire votre enfant, ensuite montez avec celui-ci à l'hôpital de jour pédiatrique au D1, 1^{er} étage.

■ Après l'intervention

Des points de sutures résorbables sont utilisés, ce qui signifie qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes après environ 1 à 3 semaines (rien ne doit être enlevé).

De la colle biologique est également apposée sur la cicatrice. Dès lors, aucun soin (ni désinfection, ni pansement) n'est nécessaire à la maison. L'enfant peut prendre une douche ou un bain rapide à partir du lendemain (pas de piscine, ni bain de mer durant 1 mois).

Il faut appliquer de la crème (Terra-Cortril + Polymixine) sur le méat urinaire uniquement, deux fois par jour.

À la sortie de l'hôpital, des anti-douleurs sont prescrits : paracétamol (ex : Dafalgan®), Perdolan®,... et ibuprofène (ex : Nurofen®), en fonction du poids. Ce traitement permet à votre enfant d'avoir moins mal et de retrouver ses activités normales le plus rapidement possible.

Un rendez-vous en chirurgie est prévu environ 10 à 15 jours après l'intervention.

■ Complications possibles

- ▶ Saignement/ hématome
- ▶ Gonflement de la verge pendant quelques jours, qui se résorbe spontanément
- ▶ Infection de la cicatrice
- ▶ Sténose du méat urinaire (très rare - <1%, peut nécessiter une autre intervention)

En cas de problème, vous pouvez contacter la consultation de pédiatrie ou vous rendre aux urgences.